



Seffalair[®]
Spiromax[®]
salmeterol/fluticasone



ZUM
ANWENDUNGS-
VIDEO



Seffalair[®]
Spiromax[®]
salmeterol/fluticasone

DOSIERUNG

Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren:

2x täglich 1 Einzeldosis der vom Arzt, bzw. von der Ärztin verschriebenen Dosierungsstärke von Seffalair[®] Spiromax[®]. Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung und hören Sie nicht von sich aus mit der Behandlung auf. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

LAGERUNG

In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur (15–25°C) und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Den Inhalator erst unmittelbar vor dem ersten Gebrauch aus dem Beutel nehmen. Nach Anbruch innert 60 Tagen aufbrauchen.

REINIGUNG

Bei Bedarf reinigen Sie das Mundstück des Inhalators Seffalair[®] Spiromax[®] mit einem sauberen trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals ein feuchtes Tuch oder sonstige Flüssigkeiten.

Lesen Sie vor Gebrauch von Seffalair[®] Spiromax[®] die **Packungsbeilage**.



Seffalair® Spiromax®


salmeterol/fluticasone

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG



SEFFALAIR® SPIROMAX®

1




ÖFFNEN – VORBEREITEN

- Halten Sie den Inhalator **aufrecht** und **öffnen** Sie die gelbe Verschlusskappe, bis es hörbar **klickt**.
- **Eine Dosis** ist nun zur Inhalation bereit.

Ihr Seffalair® Spiromax® Inhalator setzt die Arzneimitteldosis als **sehr feines Pulver** frei, das Sie möglicherweise weder spüren noch schmecken. Inhalieren Sie **keine zusätzliche Dosis**, auch wenn Sie das Arzneimittel nicht wahrnehmen.

2




INHALIEREN

- Halten Sie den Inhalator von Ihrem **Mund entfernt**.
Atmen Sie soweit wie möglich **aus**.

Wichtig: Atmen Sie niemals in Ihren Inhalator aus!

- Nehmen Sie das **Mundstück** in den Mund und umschliessen Sie es fest mit Ihren **Lippen**.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Ihren Lippen oder Ihren Fingern den **Luftschlitz** verdecken.
- Atmen Sie **schnell und tief** durch den Inhalator ein, nicht durch die Nase.
- Nehmen Sie den Inhalator aus Ihrem Mund.
- **Halten** Sie Ihren Atem etwa 10 Sekunden an, bzw. solange es Ihnen möglich ist.
- Atmen Sie langsam aus.
- Spülen Sie Ihren Mund nach jeder Inhalation mit **Wasser** und spucken Sie dieses aus.

3



SCHLIESSEN

- Schliessen Sie die gelbe **Verschlusskappe** fest über das Mundstück. Tun Sie das nach jeder Inhalation, dann ist Ihr Inhalator wieder für eine neue Inhalation einsatzbereit.
- Ein unbenutzter Pulverinhalator enthält 60 Dosen Ihres Arzneimittels.



Auf dem Dosenzähler können Sie die Anzahl der verbleibenden Dosen ablesen. Die Zahlen 20 bis 0 sind in Rot markiert, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass nur noch wenige Dosen vorhanden sind.

WICHTIG

Lassen Sie den Inhalator **geschlossen**, wenn Sie ihn nicht benutzen. Öffnen Sie nicht unnötig die gelbe Verschlusskappe. Wenn Sie die gelbe Verschlusskappe öffnen und schliessen ohne zu inhalieren, registriert der Dosenzähler dies trotzdem als eine Dosisentnahme und die Anzahl der verfügbaren Dosen reduziert sich um 1. Diese Dosis verbleibt im Innern des Inhalators. Es ist nicht möglich, dass aus Versehen mehr Arzneimittel oder eine doppelte Dosis in einer Inhalation angewendet wird. Auch wenn der Inhalator leer ist, hören Sie ein Klickgeräusch, wenn Sie die gelbe Verschlusskappe öffnen.